arXiv:math/0205070v1 [math.GM] 7 May 2002

UNE CARACTÉRISATION DES FONCTIONS HOLOMORPHES INJECTIVES EN ANALYSE ULTRAMÉTRIQUE.

JUAN RIVERA-LETELIER

Résumé. On montre qu'une fonction holomorphe non-constante f définie sur un sous-espace analytique de $\mathbb{C}_p$ est injective si et seulement si on a

$$\left|\frac{f(x)-f(y)}{x-y}\right|^2 = |f'(x)\cdot f'(y)|, \text{ pour tous } x \text{ et } y \text{ distincts.}$$

Cette caractérisation démontre l'analogue, pour les fonctions holomorphes, d'une conjecture de A. Escassut et M.C. Sarmant. D'autre part on donne une contre-exemple à cette conjecture, qui concerne les éléments bi-analytiques.

Abstract. We prove that a non constant holomorphic function f defined over an analytic subspace of $\mathbb{C}_p$ is injective if and only if

$$\left|\frac{f(x)-f(y)}{x-y}\right|^2 = |f'(x)\cdot f'(y)|, \text{ for every distinct } x \text{ and } y.$$

This caracterisation proves the analogue, for holomorphic functions, of a conjecture of A. Escassut and M.C. Sarmant. On the other hand we give a counter example to this conjecture, that concerns bi-analytic elements.

Fixons un nombre premier p et soient $\mathbb{Q}_p$ le corps des nombres p-adiques et $\mathbb{C}_p$ la plus petite extension algébriquement close et complète de $\mathbb{Q}_p$. On note $\mathbb{C}_p^*$ le groupe multiplicatif des éléments non-nuls de $\mathbb{C}_p$ et on note $|\mathbb{C}_p^*| = \{|z| \mid z \in \mathbb{C}_p^*\}$, où $|\cdot|$ est la norme de $\mathbb{C}_p$.

Une *boule fermée* (resp. *ouverte*) de $\mathbb{C}_p$ est un ensemble de la forme

$$\{z \in \mathbb{C}_p \mid |z-a| \le r\} \text{ (resp. } \{z \in \mathbb{C}_p \mid |z-a| < r\}),$$

où $a \in \mathbb{C}_p$ et $r \in |\mathbb{C}_p^*|$. Un *affinoïde* (*fermé*) est un ensemble de la forme $B - (B_1 \cup \ldots \cup B_n)$, où B est une boule fermée et les boules $B_1, \ldots, B_n$ sont ouvertes. Un *espace analytique* est une réunion croissante d'affinoïdes.

Date: Avril 2002.

Une *fonction holomorphe définie sur un affinoïde* est une limite uniforme de fonctions rationnelles sans pôles dans l'affinoïde. Une *fonction holomorphe* est une fonction définie sur un espace analytique $X \subset \mathbb{C}_p$, telle que sa restriction à tout affinoïde contenu dans X est holomorphe, voir e.g. [FvP] ou [Y].

Théorème 1. *Soit $X \subset \mathbb{C}_p$ un espace analytique et soit f une fonction holomorphe non-constante. Alors f est injective si et seulement si on a*

$$\left|\frac{f(x)-f(y)}{x-y}\right|^2 = |f'(x)\cdot f'(y)|, \ \textit{pour tous } x,y \in X \textit{ distincts.} \tag{1}$$

Pour $a,b,c,d \in \mathbb{C}_p$ distincts on appelle $R(a,b\,;c,d) = \frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)} \in \mathbb{C}_p^*$ le *birapport* de (a,b,c,d). La preuve du corollaire suivant est ci-dessous.

Corollaire 1. *Soit f une fonction holomorphe et injective définie sur un espace analytique $X \subset \mathbb{C}_p$. Alors pour tous $a,b,c,d \in \mathbb{C}_p$ distincts, le birapport $R(f(a),f(b)\,;f(c),f(d))$ est bien défini et on a*

$$|R(a,b\,;c,d)| = |R(f(a),f(b)\,;f(c),f(d))|.$$

Il est facile de voir que toute fonction qui préserve le birapport coïncide avec une homographie. Donc on peut interpréter le Théorème 1 en disant que les fonctions holomorphes qui sont injectives sont celles qui sont "proches" des homographies.

La démonstration que la propriété (1) implique que f est injective est simple et assez générale. Pour montrer l'implication inverse, on considère l'application $f_* : \widehat{X} \longrightarrow \mathbb{H}_p$ induite par f, où $\mathbb{H}_p$ est l'espace hyperbolique p-adique et $\widehat{X}$ est l'enveloppe convexe de X dans $\mathbb{H}_p$; voir [R-L1], [Y], [R-L2]. La propriété (1) suit facilement du fait que, quand f est injective, l'application f_* induit une isométrie entre $\widehat{X}$ et $f_*(\widehat{X})$, voir [R-L1], [Y].

Preuve du Corollaire 1. Comme f est injective, les points $f(a)$, $f(b)$, $f(c)$, $f(d) \in \mathbb{C}_p$ sont distincts et donc le birapport $R(f(a),f(b)\,;f(c),f(d))$ est bien défini. Si l'on applique la propriété (1) aux paires (a,c), (b,d), (a,d) et (b,c) on obtient

$$\frac{|R(f(a),f(b)\,;f(c),f(d))|^2}{|R(a,b\,;c,d)|^2} = \frac{|f'(a)\cdot f'(c)|\cdot|f'(b)\cdot f'(d)|}{|f'(a)\cdot f'(d)|\cdot|f'(b)\cdot f'(c)|} = 1.$$

$\square$

1. Sur les éléments analytiques et bi-analytiques.

Pour des références générales à cette section on renvoie le lecteur à [1].

Rappelons qu'un *élément analytique* défini sur une partie $D \subset \mathbb{C}_p$, est une limite uniforme de fonctions rationnelles sans pôles dans D. Un élément analytique injectif dont l'inverse est aussi un élément analytique, est appelé *bi-analytique*. Rappelons finalement qu'une partie $D \subset \mathbb{C}_p$ est *infraconnexe* si pour tous $a \in \mathbb{C}_p$ et $r' > r > 0$ tels que la couronne $\{r < |z-a| < r'\}$ soit disjointe de D, on a $D \subset \{|z-a| \leq r\}$ ou $D \cap \{|z-a| < r'\} = \emptyset$.

L'équivalence du Théorème 1 n'est pas valable dans d'autres contextes. En effet A. Escassut et M.C. Sarmant ont décrit un ouvert infraconnexe $D \subset \mathbb{C}_p$ où le polynôme $P_0(z) = z^2$ est injectif et tel que la fonction $P_0|_D$ ne satisfait pas la propriété (1), voir [ES] p. 161. De plus, ils ont remarqué que l'élément analytique $P_0|_D$ n'est pas bi-analytique.

Motivés par cet exemple, A. Escassut et M.C. Sarmant ont conjecturé que *pour un élément analytique défini sur un ouvert infraconnexe, la propriété* (1) *est équivalente à ce que l'élément analytique soit bi-analytique*, voir Conjecture 3 de [ES] (p. 162).

Dans [R-L3] on montre une partie de cette conjecture : tout élément bi-analytique défini sur un ouvert infraconnexe satisfait la propriété (1). D'autre part l'exemple 1 ci-dessous est un contre-exemple à l'implication inverse.

On remarque que l'inverse d'une fonction holomorphe et injective est aussi une fonction holomorphe, voir e.g. [Y] ou [Mo]. Donc le Théorème 1 implique la conjecture de A. Escassut et M.C. Sarmant, pour les fonctions holomorphes.

Exemple 1. *Considérons le polynôme $P(z) = z + z^2 \in \mathbb{C}_p[z]$. La boule unité ouverte $B = \{|z| < 1\}$ est fixée par P et la restriction de P à B préserve la distance induite par la norme $|\cdot|$. En particulier $P|_B$ satisfait la propriété* (1)*.*

Clairement $P|_B$ est un élément analytique. On montrera que $P|_B$ n'est pas bi-analytique. On utilisera la notion de bonne réduction *(introduite dans* [MS]*) et la notion de* réduction non-triviale *; voir* [R-L2] *Section 5.1.*

Supposons par contradiction que l'inverse $g : B \longrightarrow B$ de $P|_B$ est un élément analytique. Il existe alors une fonction rationnelle $R \in \mathbb{C}_p(z)$

sans pôles dans B et telle que

$$\sup\{|R(z) - g(z)| \mid z \in B\} < 1. \tag{2}$$

Comme $g(B) = B$ on a aussi $R(B) = B$ et donc R a une réduction non-triviale $\tilde{R} \in \tilde{\mathbb{C}}_p(z)$, où $\tilde{\mathbb{C}}_p$ désigne le corps résiduel de $\mathbb{C}_p$.

D'autre part, le polynôme P a une bonne réduction, égale à $\tilde{P}(z) = z + z^2 \in \tilde{\mathbb{C}}_p[z]$. Donc $\deg(\tilde{R} \circ \tilde{P}) > 1$ et par conséquent la fonction rationnelle $R \circ P(z) - z \in \mathbb{C}_p(z)$ a une réduction non-triviale, égale à $\tilde{R} \circ \tilde{P}(z) - z \in \tilde{\mathbb{C}}_p(z)$. En particulier

$$\sup\{|R \circ P(z) - z| \mid z \in B\} = 1.$$

On obtient une contradiction avec (2).

2. Une réduction.

Maintenant on réduit le Théorème 1 à la proposition suivante.

Notons que toute fonction qui préserve la distance induite par la norme $|\cdot|$, satisfait la propriété (1).

Proposition 1. *Soit $Y \subset \mathbb{C}_p$ un affinoïde et soit f une fonction holomorphe définie sur Y. Si f est injective, alors il existe une homographie φ telle que $\varphi \circ f(Y) \subset \mathbb{C}_p$ et telle que $\varphi \circ f$ préserve la distance induite par la norme $|\cdot|$.*

Preuve du Théorème 1. Soit f une fonction holomorphe non-constante définie sur X et satisfaisant la propriété (1). Notons que si pour un certain $x \in X$ on a $f'(x) = 0$, alors la propriété (1) implique que f est constante égale à $f(x)$. On conclut que $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in X$. Par conséquent si $x, y \in X$ sont distincts, on a

$$|f(x) - f(y)|^2 = |x - y|^2 |f'(x) \cdot f'(y)| \neq 0,$$

et donc $f(x) \neq f(y)$.

Supposons d'autre part que f est une fonction holomorphe et injective, définie sur X. Etant donnés $x, y \in X$ distincts, soit $Y \subset X$ un affinoïde contenant x et y. Par la Proposition 1, il existe une homographie φ telle que $\varphi \circ f(Y) \subset \mathbb{C}_p$ et telle que $\varphi \circ f|_Y$ préserve la distance induite par la norme $|\cdot|$.

En particulier la fonction $\varphi \circ f|_Y$ satisfait la propriété (1). Comme φ est une homographie, ceci implique que la fonction f satisfait aussi la propriété (1) pour $x, y \in X$. □

3. Espace hyperbolique p-adique.

Pour des références à cette section on renvoie le lecteur à [Y] ou [R-L2].

Considérons la relation d'équivalence $\sim$ sur $\mathbb{C}_p \times \mathbb{R}$ définie par

$$(w,r) \sim (w',r') \text{ si et seulement si } r = r' \text{ et } p^r \geq |w - w'|.$$

On considère la distance d sur $\mathbb{C}_p \times \mathbb{R}$ induite par la distance usuelle de $\mathbb{R}$: la distance entre les points représentés par (w,r) et (w',r') est donnée par $|r - r'|$ si $|w - w'| \leq p^{\max\{r,r'\}}$ et en général par

$$2\max\{r, r', \log_p |w - w'|\} - r - r'.$$

L'*espace hyperbolique* $\mathbb{H}_p$ est par définition l'espace métrique $(\mathbb{C}_p \times \mathbb{R}/\sim, d)$ (voir Appendice 2 de [R-L2], où on a considéré la complétion de cet espace métrique). Les *points rationnels* de $\mathbb{H}_p$ sont par défintion les points représentés par (w,r), avec r rationnel.

Le groupe des homographies agit par isométries sur $\mathbb{H}_p$; pour une homographie φ, on note φ_* l'action sur $\mathbb{H}_p$ correspondante. Cette action est déterminée, au niveau de $\mathbb{C}_p \times \mathbb{R}$, par les définitions suivantes :

- Si $T(w) = w + t$, $t \in \mathbb{C}_p$, alors $T_*((w,r)) = (w + t, r)$.
- Si $M(w) = \lambda w$, $\lambda \in \mathbb{C}_p^*$, alors $M_*((w,r)) = (\lambda w, r + \log_p \lambda)$.
- Si $I(w) = 1/w$, alors $I_*((w,r)) = (1/w, -r)$.

Notons que cette action du groupe des homographies est transitive sur les points rationnels de $\mathbb{H}_p$.

Etant donné $r \in \mathbb{R}$, soit $\mathcal{S}_r$ le point de $\mathbb{H}_p$ représenté par $(0,r)$. On note $(0, \mathcal{S}_r) = \{\mathcal{S}_{r'} \mid r' < r\}$ et $(0, \mathcal{S}_r] = \{\mathcal{S}_{r'} \mid r' \leq r\}$, et pour $r_0 < r_1$ on note $[\mathcal{S}_{r_0}, \mathcal{S}_{r_1}] = \{\mathcal{S}_r \mid r_0 \leq r \leq r_1\}$.

Etant donné $z \in \mathbb{P}(\mathbb{C}_p) = \mathbb{C}_p \cup \{\infty\}$ et $\mathcal{S} \in \mathbb{H}_p$ on peut trouver $r \in \mathbb{R}$ et une homographie φ, tel que $\varphi(z) = 0$ et $\varphi_*(\mathcal{S}) = \mathcal{S}_r$. Alors on définit $(z, \mathcal{S}) = \varphi_*^{-1}((0, \mathcal{S}_r))$ et $(z, \mathcal{S}] = \varphi_*^{-1}((0, \mathcal{S}_r])$, qui ne dépendent pas du choix de φ. On appelle $(z, \mathcal{S})$ et $(z, \mathcal{S}]$ des *demi-géodésiques.* Pour $\mathcal{S}_0, \mathcal{S}_1 \in \mathbb{H}_p$ on définit $[\mathcal{S}_0, \mathcal{S}_1]$ de façon analogue.

4. Preuve de la Proposition 1.

Soit $Y = B - (B_1 \cup \ldots \cup B_n)$ un affinoïde. Considérons $a \in B$ et posons $r = \operatorname{diam}(B) \in |\mathbb{C}_p^*|$. On note $\mathcal{S}$ le point (rationnel) de $\mathbb{H}_p$ représenté par $(a, \log_p r) \in \mathbb{C}_p \times \mathbb{R}$. On appelle $\widehat{Y} = \cup_{z \in Y}(z, \mathcal{S}]$ l'*enveloppe convexe de* Y ; voir [R-L2] Section 3.3.

Toute fonction holomorphe f définie sur Y induit une application $f_* : \widehat{Y} \longrightarrow \mathbb{H}_p$, voir [Y]. De plus, si f est injective, alors f_* induit une isométrie entre $\widehat{Y}$ et $f_*(\widehat{Y})$.

La Proposition 1 est une conséquence immédiate de la proposition suivante.

Proposition 2. *On garde les notations précédentes. Alors on a les propriétés suivantes.*

1. *Il existe une homographie* φ *telle que* $(\varphi \circ f)(Y) \subset B$ *et* $(\varphi \circ f)_*(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$.
2. *Si* $f(Y) \subset B$ *et* $f_*(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$, *alors* f *préserve la distance induite par la norme* $|\cdot|$.

Preuve. 1.– Après un changement de coordonnée affine au départ on suppose $B = \{|z| \leq 1\}$. Comme le groupe des homographies agit de façon transitive sur les points rationnels de $\mathbb{H}_p$, on peut trouver une homographie φ telle que $(\varphi \circ f)_*(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$.

Soit $\mathcal{O}_p = B = \{|z| \leq 1\}$ l'anneau des entiers de $\mathbb{C}_p$ et soit $\mathfrak{m}_p = \{|z| < 1\}$ son idéal maximal. On étend la projection de $\mathcal{O}_p$ à $\tilde{\mathbb{C}}_p = \mathcal{O}_p/\mathfrak{m}_p$, à une projection π de $\mathbb{P}(\mathbb{C}_p)$ à $\mathbb{P}(\tilde{\mathbb{C}}_p)$, par $\pi^{-1}(\infty) = \mathbb{P}(\mathbb{C}_p) - \mathcal{O}_p$. Notons que deux points $z, z' \in \mathbb{P}(\mathbb{C}_p)$ ont la même projection dans $\mathbb{P}(\tilde{\mathbb{C}}_p)$ si et seulement si l'intersection $(z, \mathcal{S}) \cap (z', \mathcal{S})$ est non-vide.

Comme $(\varphi \circ f)_*$ induit une isométrie entre $\widehat{Y}$ et $(\varphi \circ f)_*(\widehat{Y})$, pour tout $z \in Y$ on a $(\varphi \circ f)_*((z, \mathcal{S})) = (\varphi \circ f(z), \mathcal{S})$. Par conséquent $\varphi \circ f$ induit une application de $\pi(Y) \subset \mathbb{P}(\tilde{\mathbb{C}}_p)$ à $\mathbb{P}(\tilde{\mathbb{C}}_p)$. On sait que cette application est une restiction d'une fonction rationnelle $\tilde{f} \in \tilde{\mathbb{C}}_p(z)$, voir [Y]. De plus, comme f est injective sur Y, le degré de $\tilde{f}$ est égale à 1. Donc on peut choisir φ de telle façon que $\tilde{f}$ soit égale à l'identité. Comme $Y \subset B = \mathcal{O}_p$, dans ce cas on a $\varphi \circ f(Y) \subset \mathcal{O}_p = B$.

2.– Etant donné deux points $x, y \in B$, soit $\mathcal{S}_{x,y}$ le point de $\mathbb{H}_p$ déterminé par $(x, \mathcal{S}] \cap (y, \mathcal{S}] = [\mathcal{S}_{x,y}, \mathcal{S}]$. On a

$$|x - y| = \mathrm{diam}(B) \cdot p^{-d(\mathcal{S}_{x,y}, \mathcal{S})}.$$

Comme $f_*(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$ et f_* induit une isométrie entre $\widehat{Y}$ et $f_*(\widehat{Y})$, pour tout $z \in Y$ l'image de la demi-géodésique $(z, \mathcal{S}]$ par f_* est la demi-géodésique $(f(z), \mathcal{S}]$. Donc pour $x, y \in Y$ distincts on a $f_*(\mathcal{S}_{x,y}) = \mathcal{S}_{f(x),f(y)}$ et par conséquent

$$d(\mathcal{S}_{f(x),f(y)}, \mathcal{S}) = d(f_*(\mathcal{S}_{x,y}), f_*(\mathcal{S})) = d(\mathcal{S}_{x,y}, \mathcal{S}).$$

Comme $f(x), f(y) \in B$ on obtient

$$|f(x) - f(y)| = \mathrm{diam}(B) \cdot p^{-d(\mathcal{S}_{f(x),f(y)}, \mathcal{S})} = \mathrm{diam}(B) \cdot p^{-d(\mathcal{S}_{x,y}, \mathcal{S})} = |x - y|.$$

□

Remerciements.

Je remercie A. Escassut et J.C. Yoccoz pour des discussions relies à ce travail. Mes remerciments vont aussi à M. Flexor qui a fait des corrections d'orthographie. Ce papier a été ecrit pendent le "Research Trimester on Dynamical Systems" à Pisa.

References

[1] A. Escassut. *Analytic elements in p-adic analysis.* World Scientific Publishing, 1995.

[ES] A. Escassut, M.C. Sarmant. *Injectivity, Mittag-Leffler series and Motzkin products.* Ann. Sci. Math. Québec, **16** (1992), 155-173.

[FvP] J. Fresnel, M. van der Put. *Géométrie Analytique rigide et applications.* PM 18, Birkhäuser 1981.

[MS] P. Morton, J. Silverman. *Periodic points, multiplicities, and dynamical units.* J. Reine Agnew. Math. **461** (1995), $81 - 122$.

[Mo] E. Motzkin. *L'arbre d'un quasi connexe : un invariant conforme p-adique.* Groupe d'étude d'analyse ultramétrique, 9eme année, **3** (1981/82), 18p.

[R-L1] J. Rivera-Letelier. *Dynamique des fonctions rationnelles sur des corps locaux.* Thèse, Orsay 2000.

[R-L2] J. Rivera-Letelier. *Espace hyperbolique p-adique et dynamique des fonctions rationnelles.* A paraître dans Comp. Math.

[R-L3] J. Rivera-Letelier. *Une caractérisation locale des éléments bi-analytiques.* Texte 2002.

[Y] J.C. Yoccoz. Notes d'un cours au Collège de France, 2001/2002.

J. Rivera-Letelier, Mathematics Department, SUNY at Stony Brook, Stony Brook, NY 11794-3660

E-mail address: `rivera@math.sunysb.edu`